


A leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségek

Trichomoniasis

A WHO adatai szerint a trichomonas vaginalis ostoros egysejtű vezeti a szexuális úton terjedő betegségek listáját. Nemcsak nemi aktussal, de uszodában, nem megfelelően takarított mosdókban is elkaphatjuk. Férfiaknál a húgycsőben, prosztatában, nőknél a hüvelyben, húgycsőben tenyészik. A férfiak inkább hordozók, míg nőknél hüvelyfolyás, fájdalmas közösülés, viszketés, okoznak kellemetlenséget.



Chlamydia

"Chlamídia trachomatis" baktérium okozta fertőzés gyakran tünetmentes. Kifejlődése esetén jellemző a húgycsőgyulladás, a nemi szervek körüli duzzanat, a nyirokcsomók megnagyobbodása, kismedencei gyulladás, alhasi fájdalmak, vagy éppen a nemi szervek megnagyobbodása.



b220366 [RM] © www.visualphotos.com

Gombás fertőzés

Leggyakrabban sarjadzógomba, (Candida albicans) okozza. Nőknél a hüvely érzékeny, kipirult, rossz szagú a hüvelyváladék. Férfiaknál csípő vizeleti érzés, fehér színű húgycsőváladék, vörös, érzékeny a makk és a fityma belső lemeze.




HIV

HPV

A humán papillomavírus egy olyan víruscsalád, mely veszélyes nemi betegségek kialakulásáért felelős. Tünetei közé soroljuk például a nemi szervek tájékán megjelenő szemölcsöket, melyek ecseteléssel vagy műtéti úton eltávolíthatóak. Ugyanakkor a víruscsalád egyes típusai akár méhnyakrákot is okozhatnak.

Gonorrhoea

A tripper vagy kankó néven közismertté vált betegséget a gonococcus baktérium okozza, mely nemcsak közösülés útján, de szüléskor, anyáról gyermekére is áterjedhet. A betegség a húgycső és a méh, petefészek gyulladását eredményezheti. Férfiak esetében, a prosztatata, a here és az ondóvezeték gyulladását okozhatja.




Herpesz (genitalis)

A nemi herpeszt egy vírus okozza, mely a kezdeti stádiumban általában tünetmentességet mutat. Mint az ajakherpesz az idegganglionokban lakik, és időnként kiszabadulva okozza a panaszokat. Nemi érintkezés, illetve szülés során anyáról gyermekre is áterjedhet. Folyadékkal teli fájdalmas, viszkető hólyagok jelennek meg a nemi szerveken. Kis nedvedző fekélyek maradhatnak utána. Nyirokcsomó megnagyobbodással is járhat az ágyéki részeken. Gyógyulása után hosszabb-rövidebb szünet után visszatér. A tudomány jelenlegi álláspontja szerint nem gyógyítható.

Szifilisz

A vérbajként elhíresült betegség nemi érintkezéssel és szüléskor, a baba szülőcsatornával való érintkezésekor terjed. A betegség egy fájdalmas fekélyvel és az ágyéki nyirokcsomók megnagyobbodásával jelzi jelenlétét, majd később viszkető bőrkiütéseket, májgyulladást okoz, a végső stádiumban pedig szív- és érrendszeri elváltozásokhoz, ismétlődő fekélyekhez és központi idegrendszeri tünetekhez vezet. Kezelés nélkül kimenetele halálos.



Hepatitis B, C

A fertőző májgyulladást okozó betegség gyakran szexuális úton terjed. A májgyulladásán túl tünetei közé soroljuk a magas lázat és a sárgaságot is. B típusa gyengébb, így már létezik ellene megfelelő védőoltás, míg a C típusú hepatitis progresszíven támadja a májat, gyógyítani pedig gyakorlatilag lehetetlen. Szövődményeként májrák alakul ki.

<http://www.szexualpszichologia.hu/nemibeteg.html>